

**Atenție! În această perioadă există un risc mai mare de îmbolnăvire cu trichineloză.**

Specialiștii epidemiologi recomandă populației să nu consume carne de porc neexaminată trichineloscopic și să evite achiziționarea acesteia din alte locuri decât magazine specializate.

De asemenea, este necesară o atenție mărită la consumul de carne de porc insuficient prelucrată termic, deoarece procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele.

Trichineloză este o boală determinată de *Trichinella spiralis*, care ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată.

Majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice, însă există și forme clinice de boală cu evoluție severă care pot cauza moartea prin complicațiile pe care le produc.

Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne ingerată, de masivitatea infestării ei și de rezistența organismului.

**Semnele clinice** de boală sunt: tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, greturi varsaturi), care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată, febra, edeme palpebrale și faciale însoțite de conjunctivită, dureri musculare și adinamie.

**Factorii favorizanti** ai îmbolnăvirii la om sunt reprezentați de:

1. **Consumul cărnii** de porc sau vânat **neexaminată trichineloscopic**
2. **Unele obiceiuri culinare**: prepararea termică “în sange”, sau consumul de preparate crude sau insuficient prelucrate termic: pastrama, carnat uscat sau afumat, sunca.
3. **Achiziționarea** de către populație a **cărnii din alte locuri** decât centrele comerciale specializate.
4. **Tăierea clandestină** a animalelor

Boala nu se transmite interuman.